



+36-1-240-1880



info@g1labor.hu



www.gmlabor.hu



1036 Budapest, Lajos u. 74-76. 1. emelet

GM labor

ADATLAP I.

A NŐGYÓGYÁSZATI, BELGYÓGYÁSZATI, ENDOKRINOLÓGIAI, INFECTOLÓGIAI ÉS GENETIKAI SZŰRŐVIZSGÁLATOK EREDMÉNYEINEK ÖSSZESÍTÉSE

Név:
TAJ:
Születési idő:
Lakcím, telefonszám, e-mail cím:
Szülészeti anamnézis: (előző terhességek ideje, száma; a terhességek kimenetele; a spontán vetélések hányadik héten következtek be; a terhességek ugyanettől a partnertől voltak-e, a beteg IVF programban van-e)

I. Szülészeti-nőgyógyászati funkcionális és anatómiai háttér tisztázása

1. Külső, **bimanuális** és **UH** vizsgálattal a női nemi szervek anatómiailag:

- a. épek b. kórosak, éspedig:

2. A **folliculometria** során a ciklus 13. napján mért tüszőátmérő értéke a petefészekben (28 napos ciklusokat véve alapul):

- a. <20mm b. 20-22mm c. >22mm

3. A sárgatest fázisban (a ciklus 21-23. napján, két mérés alapján – 28 napos ciklusokat véve alapul) a szérum **progeszteron** szintjének mértéke:

- a. <40nm/l b. 40-60nm/l c. >60nm/l

4. A ciklus 10-12. napján a szérum **LH és FSH** szintek értékei, és egymáshoz viszonyított arányuk:

- a. $FSH \leq 10$ U/L; $LH \leq 10$ U/L; arányuk 1:3 –nál kevesebb
b. vagy az FSH, vagy az LH, vagy mindkettő értéke nagyobb, mint 10 U/L
c. az FSH-LH arány 1:3 vagy annál több

5. A ciklus 10-12. napján a szérum **ösztadiol** értéke:

- a. 0,3-0,4nmol/l b. <0,3nmol/l c. >0,4nmol/l

6. A szérum **prolaktin** szintje:

- a. ≤ 18 ng/ml b. > 18 ng/ml



7. A szérum **AMH** szintje:

- a. $< 0,5 \text{ ng/ml}$ b. $0,5 - 1,0 \text{ ng/ml}$ c. $> 1,0 \text{ ng/ml}$

8. **Uterus cavum** anatómiai vizsgálata (Hystoroscopia vagy a cavum 3D UH vizsgálata):

- a. normális b. kóros, éspedig:

9. A **férj/partner andrológiai** (spermiogram) lelete 3 napos carentiát követően:

- a. normális
b. kóros spermiogram (aspermia, hypospermia, hyperspermia, azoospermia, cryptozoospermia, oligozoospermia, polyzoospermia, asthenozoospermia, teratozoospermia, necrozoospermia)

10. A **férj ondótenyésztésének** eredménye: _____

11. **Irreguláris antitest:**

- a. nincs b. van, éspedig milyen: _____

II. Általános belgyógyászati vizsgálat

- a. a habituális vetélőnek nincs rendszerbetegsége
b. a betegnél rendszerbetegség vagy egyéb kórkép diagnosztizálható, éspedig:

III. Általános endokrinológiai kivizsgálás

1. A betegnél **congenitális adrenális hyperplasia** vagy **Cushing kór**

- a. diagnosztizálható b. nem diagnosztizálható

2. **Pajzsmirigyműködés szűrése**; a szérum TSH szintje:

- a. $< 0,3 \text{ mU/L}$ b. $0,3 - 4 \text{ mU/L}$ c. $> 4 \text{ mU/L}$

3. A **pajzsmirigy fizikális vizsgálata**:

- a. strúma diagnosztizálható b. strúma nem diagnosztizálható

4. A **mellékvese-működés szűrése**:

- | | |
|--|--|
| a. kóros szőrösödés látható | b. kóros szőrösödés nem látható |
| c. a beteg obes | d. a beteg kórosan sovány |
| e. a betegnek magas vérnyomása van | |
| f. éhgyomri vércukor: $3,9 - 5,8 \text{ mmol/l}$ | g. éhgyomri vércukor: $< 3,9 \text{ mmol/l}$ vagy $> 5,8 \text{ mmol/l}$ |
| h. szérum K érték: $3,5 - 5,1 \text{ mmol/l}$ | i. szérum K érték: $< 3,5 \text{ mmol/l}$ vagy $> 5,1 \text{ mmol/l}$ |
| j. szérum Na érték: $135 - 145 \text{ mmol/l}$ | k. szérum Na érték: $< 135 \text{ mmol/l}$ vagy $> 145 \text{ mmol/l}$ |

5. A **D3 vitamin** szintje:

- a. $< 50 \text{ nmol/L}$ b. $> 50 \text{ nmol/L}$

6. A **diabetológiai háttér szűrése**:

- a. az OGTT (75 g-os teszt) 2 órás vércukorérték kisebb, mint $7,8 \text{ mmol/l}$
b. a post OGTT 2 órás vércukorérték nagyobb, mint $7,8 \text{ mmol/l}$
c. az inzulinrezisztencia-teszt normál értékeket mutat
d. az inzulinrezisztencia-teszt kóros értékeket mutat



+36-1-240-1880



info@g1labor.hu



www.gmlabor.hu



1036 Budapest, Lajos u. 74-76. 1. emelet

GM labor

IV. Thrombophilia vizsgálatok:

„Alap panel”: (FV Leiden, FII. prothrombin, MTHFR mutáció vizsgálata)

„Kiterjesztett panel”: (fentiek mellett: Protein C, Protein S, antithrombin III, beta2 glikoprotein, lupus anticoagulans, anti-cardiolipin, thrombocyta aggregáció vizsgálata, faktor XII-, Faktor VIII-szintek, plasminogen aktivátor inhibitor)

a. normális b. kóros, éspedig: _____

V. Autoimmun rutin kivizsgálás:

a. negatív b.: pozitív, éspedig: _____

„Kiterjesztett panel”: anti-spermium, anti-ovarium, anti-tTG (coliakia szűrés), anti-laminin, anti-phosphatidyl-serin és anti-phosphatidyl-inositol antitestek

a. negatív b. pozitív, éspedig: _____

VI. Genetikai vélemény (kromoszóma vizsgálat)

- a. genetikai háttér nem igazolható
b. genetikai háttér igazolható, éspedig: _____

VII. Infektológiai vizsgálatok:

- a. vírus antitest (HIV, HCV, HBsAg, TP, HBc, HBs, CMV): poz _____ neg _____
b. Toxoplazma: poz _____ neg _____
c. Luesz, Chlamydia, Mycoplasma, Ureaplasma: poz _____ neg _____

Az adatokat kitöltő orvos aláírása, pecsétje: _____

Munkahelye, elérhetősége: _____

A fenti leletek tükrében a habituális vetélés nőgyógyászati, endokrinológiai, belgyógyászati, genetikai infektológiai és andrológiai háttere nagy valószínűséggel kizárható. A beteg immunológiai kivizsgálása indokolt.

Kiadás dátuma:

szakorvos
akkreditált intézmény